



Yr amserlen imiwneiddio reolaidd i blant ar gyfer Cymru o fis Mai 2022 ymlaen

Pryd	Afiechydon y gwarchodir rhagddynt	Brechiad a roddir a'i enw		Lleoliad arferol ¹
8 wythnos oed	Difftheria, tetanws, pertwsis (y pas), polio, <i>Haemophilus influenzae</i> math b (Hib) a hepatitis B	DTaP/IPV/Hib/HepB	Infanrix hexa neu Vaxelis	Clun
	Grŵp meningococol B	MenB	Bexsero	Clun chwith
	Rotafeirws gastroenteritis	Rotafeirws	Rotarix	Drwy'r geg
12 wythnos oed	Difftheria, tetanws, pertwsis, polio, Hib a hepatitis B	DTaP/IPV/Hib/HepB	Infanrix hexa neu Vaxelis	Clun
	Niwmococol (13 seroteip)	PCV	Prevenar 13	Clun
	Rotafeirws gastroenteritis	Rotafeirws	Rotarix	Drwy'r geg
16 wythnos oed	Difftheria, tetanws, pertwsis, polio, Hib a hepatitis B	DTaP/IPV/Hib/HepB	Infanrix hexa neu Vaxelis	Clun
	Grŵp meningococol B	MenB	Bexsero	Clun chwith
12 i 13 mis oed	Hib / Grŵp meningococol C	Hib/MenC	Menitorix	Rhan uchaf y fraich/Clun
	Niwmococol	Brechiad atgyfnerthu PCV	Prevenar 13	Rhan uchaf y fraich/Clun
	Brech goch, clwy'r pennau a rwbela	MMR	MMRVaxPRO neu Priorix	Rhan uchaf y fraich/Clun
	Grŵp meningococol B	Brechiad atgyfnerthu MenB	Bexsero	Clun chwith
2 ² a 3 oed a phob plentyn oedran ysgol	Ffliw (bob blwyddyn o fis Medi ymlaen)	Brechiad ffliw byw wedi'i wanhau	Fluenz Tetra ³	Dau dwll y trwyn
3 oed a 4 mis	Difftheria, tetanws, pertwsis a pholio	dTaP/IPV	Boostrix-IPV	Rhan uchaf y fraich
	Brech goch, clwy'r pennau a rwbela	MMR	MMRVaxPRO neu Priorix	Rhan uchaf y fraich
Blynyddoedd ysgol 8 a 9 (12 i 14 oed)	Canser serfigol, rhai canserau pen a gwddw ac anogenhedlol, a defaid gwenerol a achosir gan bapilomafeirws dynol (HPV)	HPV ⁴ (dau dds 6 i 24 mis ar wahân)	Gardasil neu Gardasil 9	Rhan uchaf y fraich
Blwyddyn ysgol 9 (13 ac 14 oed)	Tetanws, difftheria a pholio	Td/IPV (gwirio statws MMR)	Revaxis	Rhan uchaf y fraich
	Grwpiau meningococol A, C, W ac Y	MenACWY	Nimenrix neu Menveo	Rhan uchaf y fraich

- Os oes angen dau frechiad neu fwy ar yr un pryd, dylid rhoi'r rhain mewn aelodau gwahanol o'r corff yn ddelfrydol. Os nad yw hyn yn bosib, dylid rhoi'r brechiadau yn yr un aelod o'r corff 2.5cm oddi wrth ei gilydd. Am fwy o fanylion gweler Penodau 4 ac 11 y Llyfr Gwyrdd. Rhoddir pob brechiad ar ffurf pigiad yn y cyhyrau oni bai y nodir fel arall.
- Rhaid i'r plentyn fod yn 2 oed erbyn 31 Awst i gael brechiad y ffliw yn rhaglen reolaidd yr hydref/gaeaf.
- Os nad yw Fluenz Tetra yn cael ei gymeradwyo, defnyddiwyd frechiad ffliw anweithredol.
- Edrychwch ar y benod berthnasol yn y Llyfr Gwyrdd am unigolion sydd angen amserlen 3 dos.

Rhaglenni imiwneiddio dethol ar gyfer plant¹

Grŵp targed	Oedran ac amserlen	Afiechyd	Brechiadau gofynnol
Babanod wedi'u geni i famau wedi'u heintio â hepatitis B	Ar enedigaeth ac 1 mis oed. Brechiad atgyfnerthu yn 12 i 13 mis oed ^{2,3}	Hepatitis B	Brechiadau Hepatitis B (Engerix B / HBVaxPRO)
Babanod mewn ardaloedd o'r wlad gydag achosion o'r TB >= 40/100,000	Ar enedigaeth	Twbercwlosis	BCG
Babanod gyda rhiant neu daid neu nain wedi'i eni mewn gwlad gyda nifer uchel o achosion ⁴	Ar enedigaeth	Twbercwlosis	BCG
Plant mewn grŵp risg ar gyfer y ffliw	6 mis i 17 oed	Ffliw	LAIV ar gyfer 2 i 17 oed. Brechiad ffliw anweithredol ar gyfer oedranau eraill neu os nad yw LAIV yn cael ei gymeradwyo

- Efallai y caiff brechiadau eraill eu hargymhell ar gyfer unigolion gyda rhai cyfyrau meddygol sylfaenol.
- Cymryd gwaed ar gyfer HBsAg i eithrio haint yn 12/13 mis oed.
- Yn ogystal rhoi Infanrix Hexa (DTaP/IPV/Hib/HepB) yn 8, 12 ac 16 wythnos oed.
- Os yw'r achosion blynyddol o TB yn >= 40/100,000 gweler www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people