



Hepatitida B,
Hepatitida C
a HIV

Nechte si ve vězení udělat testy.

Hepatitida C je...



vir vyskytující se v krvi a přenášený krevní cestou při kontaktu, například při sdílení nesterilních jehel. K přenosu může dojít při nesterilních léčebných výkonech nebo tetování.


Riziko přenosu virů vyskytujících se v krvi vzniká také při sdílení jehel a ostatního příslušenství k užívání drog, jako jsou lžice nebo fólie.

U lidí nakažených hepatitidou C se nemusejí vyskytovat žádné příznaky, nicméně pokud se onemocnění neléčí, může vir způsobit vážné poškození jater, včetně rakoviny.



Nechte se ve vězení otestovat!

Hepatitis B je...



vir vyskytující se v krvi a tělních tekutinách. Přenáší se stejně jako hepatitida C, ale k přenosu může dojít také při nechráněném pohlavním styku nebo z matky na dítě při porodu.

Nákaze je možno předejít očkováním.

Důrazně se doporučuje, abyste se při pobytu ve vězení nechali očkovat – stačí zeptat se člena vězeňské lékařské péče.



Nechte se ve vězení očkovat proti hepatitidě B!

HIV je...



vir vyskytující se v krvi a jiných tělních tekutinách, jako je například sperma.

HIV napadá imunitní systém. Vir se přenáší krevní cestou při kontaktu stejně jako hepatitida, ale k přenosu lze dojít také při nechráněném pohlavním styku.

Na HIV existuje léčba, kterou je možné dostat ve vězení. Používání kondomů pomáhá chránit proti HIV.



Nechte se ve vězení otestovat na HIV!

Vězení pro vás může být příležitostí získat více informací... a nechat se otestovat!

V tomto letáku najdete popis tří kreví přenosných virů: hepatitidy B, hepatitidy C a viru HIV. Toto jsou potenciálně vážná onemocnění, která se nemusejí projevovat žádnými příznaky a člověk si tedy ani neuvědomí, že je nakažen.

Je důležité vědět, jak se tyto nemoci přenášejí, a předejít tak riziku nakažení. Pokud si myslíte, že jste byli vystaveni takovému riziku, pak je v průběhu vašeho pobytu ve vězení k dispozici testování a léčba na kreví přenosné viry.

Nákaze viry přenosnými krví lze předejít.

- Při užívání drog v žádném případě nesdílejte jehly ani jiné příslušenství s druhými.
- Ujistěte se, že nástroje na tetování nebo piercing jsou sterilní.
- Vždy předcházejte pohlavním chorobám používáním kondomů.
- Hepatitidu B a C a onemocnění virem HIV lze léčit. Po vyšetření je možno léčbu zahájit v průběhu pobytu ve vězení. Pokud si myslíte, že u vás hrozí riziko nakažení hepatitidou B nebo C, nebo byste chtěli podstoupit jednoduchý krevní test, případně máte zájem o další informace, obraťte se na vězeňské sestry nebo lékaře.
- Nezapomeňte si říci o očkování proti hepatitidě B!



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

Produced by Public Health Wales in conjunction with G4S and HM Prison Service. Further copies can be obtained from www.publichealthwales.org/prison-health

